

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

# Назик® кидс

5% / 0,05%

## спрей за нос, разтвор

декспантенол / ксилометазолин хидрохлорид

**nasic® kids**

5% / 0,05%

## nasal spray, solution

Dexpanthenol / Xylometazoline hydrochloride

За деца на възраст между 2 и 6 години

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждате от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

### В тази листовка:

1. Какво представлява Назик® кидс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате Назик® кидс
3. Как да използвате Назик® кидс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Назик® кидс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАЗИК® КИДС И ЗА КАКОВ СЕ ИЗПОЛЗВА

Назик® кидс е спрей за нос.

Ксилометазолин има съдържащо действие, като по този начин предизвика отблъсване на лигавицата в носа.

Декспантенол е производно до пантенолена киселина; витамин, който способства за застрастване на наранената лигавица и притежава мукопротективно (предпазващ лигавиците) действие.

Назик® кидс се използва при хрема и за подлагане застрастването на лезии по назалната лигавица и съседните кожни участъци, за облекчаване на взломотрен ринит и за лечение на нарушеното дишане през носа след назална хирургична операция.

Назик® кидс е предназначен за употреба при деца от 2 до 6 години.

### 2. КАКОВ ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЗИК® КИДС

#### Не използвайте Назик® кидс:

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към ксилометазолин или декспантенол, или към някоя от останалите съставки на Назик® кидс;
- ако страдате от сухо възпаление на лигавицата на носа и образуване на корички (сух ринит);
- след осъществено през носа оперативно отстраняване на епифизата (трансфеноидна хипофизектомия);
- при деца под 2 години.

#### Обърнете специално внимание при употребата на Назик® кидс:

- ако приемате инхибитори на монаминооксидазата (MAO инхибитори) или други лекарствени продукти, които биха могли да повишат кръвното налягане;
- ако имате повищено вътрешно налягане, особено при тясноъгълна глаукома;
- ако страдате от тежки сърдечно-съдови заболявания (напр. коронарна сърдечна болест, високо кръвно налягане (хипертония),
- ако имате тумор на надбъречната жлеза (феокромоцитом),
- ако страдате от метаболитни разстройства (напр. серъзактивност на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм), диабет),
- ако страдате от порfiria,
- ако имате простатна хиперплазия.

Лекарственият продукт може да се използва при хроничен ринит само под лекарско наблюдение, поради опасност от намаляване на назалната лигавица.

#### Употреба при деца:

Продължителната употреба и предозирането трябва да се избягват, особено при деца. Употребата на по-високи дози трябва да се провежда само под медицински контрол.

Назик® кидс съдържа концентрация на активните вещества, предназначена за деца на възраст между 2 и 6 години и затова не е подходящ за кърмачета и деца под 2 години.  
За деца над 6 години и възрастни се предлага спрей за нос с по-високи концентрации на активните вещества.

#### Други лекарства и Назик® кидс

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насокате приемали други лекарства, включително и такива, отпусканни без рецептa.

Едновременната употреба на Назик® кидс с някои лекарствени продукти, които повдигнат настроението (транзилцитроминови монаминооксидазни инхибитори или трициклични антидепресанти) може да доведе до повишаване на кръвното налягане в резултат на ефектите върху сърдечно-съдовите функции.

#### Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Назик® кидс не трябва да се използва по време на бременност поради отсъствието на достатъчно данни за приложението на ксилометазолин хидрохлорид при бременни жени.

Назик® кидс не трябва да се използва от кърмачи жени, тъй като не е известно дали ксилометазолин хидрохлорид преминава в майчиното мляко.

#### Шофиране и работа с машини

При използване на този лекарствен продукт в съответствие с указанията, не се очакват прояви на някакъв ефект по отношение на способността да шофираме или работа с машини.

Назик® кидс съдържа безалкохолен хлорид и затова не трябва да се използа при пациенти с известна чувствителност към този консервант.

### 3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЗИК® КИДС

Винаги използвайте Назик® кидс точно както е описано в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### Начин на приложение:

За приложение в носа

#### Стъклена бутилка с фиксиран връзъскащ накрайник

Отстраните защитната капачка от връзъскащия накрайник. Преди първото приложение на спрея, трябва да се напомпа няколко пъти, до получаване на равномерно връзъскване. След това, при всяко следващо приложение, дозирайте спрей за готов за употреба.

 Вкарайте връзъскащия накрайник в ноздрата, така че спреят да бъде във вертикална позиция и връзъскайте веднъж. След употреба почистете накрайника и отново поставете защитната капачка.

#### Дозировка:

Ако не е изписано друго от лекар, при деца на възраст между 2 и 6 години се прилага по едно връзъскване във всяка ноздра, до 3 пъти на ден. Приложението зависи от индивидуалната чувствителност и терапевтичния ефект.

#### Продължителност на приложението:

Назик® кидс не трябва да се използва по-дълго от 7 дни, освен ако е предписано друго от лекар или стоматолог. Продължителността на лечението при деца трябва винаги да се определя след консултация с лекар.

Необходим е няколкодневен период преди възобновяване на лечението.

Хроничната употреба на Назик® кидс може да предизвика тряйно набъбване и евентуално атрофия на лигавицата на носа.

Пациентите, страдащи от глаукома, особено от тясноъгълна глаукома, трябва да се консултират с лекар преди употреба на Назик® кидс.

Ако смятате, че ефектът от лечението с Назик® кидс е твърде слаб, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Назик® кидс (напр. предизвикано или случайно погълнат на големо количество Назик® кидс), може да се появят следните симптоми:

Сиване на зениците (миоза), разширяване на зениците (мидриза),

гадене, повръщане, посиняване на устните (цианоза), треска, бърчове,

сърдечно-съдови нарушения (тахикардия, сърдечни аритмии, циркулаторен колапс, сърден арест, хипертония), дихателни нарушения (белодробен оток, респираторна дисфункция), психични разстройства.

Може да се наблюдават и сънливост, понижаване на телесната температура, намалена сърдечна честота, рязко понижаване на кръвното налягане, спиране на дишането и кома.

#### Ако сте пропуснали да използвате Назик® кидс

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза, а продължете лечението съгласно инструкциите за употреба.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар, или фармацевт.

#### 4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Назик® кидс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.  
Нежеланите лекарствени реакции са класифицирани според тяхната честота, като е използвана следната схема:

много чести	при повече от 1 от 10 пациенти, лекувани с лекарствения продукт
чести	1 до 10 пациенти от 100 пациенти, лекувани с лекарствения продукт
нечести	1 до 10 пациенти от 1000 пациенти, лекувани с лекарствения продукт
редки	1 до 10 пациенти от 10000 пациента, лекувани с лекарствения продукт
много редки	по-малко от 1 пациент от 10000 пациента, лекувани с лекарствения продукт
неизвестни	не може да се определи от наличните данни

Възможни нежелани реакции:

#### Респираторни, гръден и медиастинални нарушения

Много редки: Засилване на назалната конгестия след преминаване на ефекта на лекарствения продукт (реактивна хиперемия), кървене от носа (епистаксис).

Неизвестна честота: Парене и сухота на назалната лигавица, кихане

#### Нарушения на нервната система

Много редки: Главоболие, безсъние или умора, възбуда; халюцинации (при по-големи деца)

#### Сърдечни нарушения

Редки: Палпитации, ускорена сърдечна дейност (тахикардия), повишаване на кръвното налягане (хипертония)

Много редки: Сърдечни аритмии

#### Нарушения на имунната система

Много редки: Реакции на непоносимост (ангиоедем, обрив, екзема)

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарства:

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### 5. КАК ДА СЪХРАНИВАТЕ НАЗИК® КИДС

Този лекарствен продукт не изиска специални условия на съхранение. Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Назик® кидс след срока на годност, отбелзан върху опаковката.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

След отваряне на опаковката, продуктът е годен за употреба в продължение на 12 седмици.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### 6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

##### Какво съдържа Назик® кидс

- Активни вещества са: ксилометазолин хидрохлорид и декспантенол, В 10 mL разтвор се съдържаат 5 mg ксилометазолин хидрохлорид и 500 mg декспантенол.

Всяко въръскване от 0,1 mL (еквивалентно на 0,10 g) от разтвора съдържа 0,05 mg ксилометазолин хидрохлорид и 5,0 mg декспантенол.

- Другите съставки са: бензалкоинев хлорид 0,02 mg/0,1 mL, калиев дихидрогенфосфат динатриев фосфат додеакахидрат (РН Еур), пречиствена вода.

##### Как изглежда Назик® кидс и какво съдържа опаковката

Многодозов контейнер с помпа за въръскване. Назик® кидс има постоянно фиксирана разпръскваща дюза. Поради това, технически неизбежно е, да има остатъчно количество, до което разпръскащата дюза да не може да достигне. Както е посочено обаче, гарантираното минимално количество, което може да бъде използвано, е 10 mL.

Назик® кидс е бъстър, безцветен спрей за нос, който се предлага в опаковки, съдържащи 10 mL разтвор.

Този спрей за нос се предлага и с по-висока концентрация на активното вещество, подходящ за възрастни и деца над 6 години.

##### Притежател на разрешението за употреба

Cassella-med GmbH & Co. KG

Gereonstrasse 1, 50670 Köln, Германия

Phone: +49 221 / 1652 – 0

Fax: +49 221 / 1652 – 513

E-mail: dialog@cassella-med.eu

##### Производител

Klosterfrau Berlin GmbH

Motzener Str. 41, 12277 Berlin

Германия

Телефон: +49 30 / 720070

Факс +49 30 / 720072 34

##### Дата на последно одобрение на листовката

Април/2015

Рег. № 20060661

##### Свойства на Назик® кидс:

Физиологичната роля на въздухопроводните пътища в носа е да затоплят, овлажняват и филтрират въдишваният въздух, като по този начин предпазват бронхиалното дърво от охлаждане и изсушене. Поради тези функции, носните пътища са покрити с добре кръвоснабдявана лигавица.

Различни фактори (напр. хрема или хирургични интервенции) могат да увредят назалната лигавица.

Подобни стимули предизвикват набъбване на лигавицата на носа, нарушило дишане през носа и усещане за „запушване“ на носа.

С оглед облекчаване на възпалителното набъбване на носната лигавица, предизвикано от хрема или хирургична интервенция, Назик® кидс назален спрей се прилага локално върху назалната лигавица, осигурявайки директно въздействие от страна на активните вещества ксилометазолин хидрохлорид и декспантенол.

Ксилометазолин хидрохлорид осигурява продължително отбъбване на оточната лигавица и облекчаване на дишането през носа, което се проявява в рамките на няколко минути след приложението. Рационалното засилване на този ефект се постига посредством комбинирането на ксилометазолин хидрохлорид с декспантенол. Декспантенол представлява производно на пантотеновата киселина, витамин необходим за всички тъкани в човешкия организъм, компонент на редовния хранителен режим.