

UPUTA ZA PACIJENTA

# neo-angin®

1,2 mg + 0,6 mg + 5,72 mg

PASTILA

BEZ ŠEĆERA

2,4-diklorbenzilni alkohol, amilmetakrezol, levomentol

**Pažljivo pročitajte ovu uputu, jer sadrži važne informacije.**

Iako se lijek ne izdaje na liječnički recept, **neo-angin® bez šećera** morate pažljivo koristiti kako bi liječenje bilo što djelotvornije.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je morati ponovno pročitati.

Za dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.

Ako se simptomi pogoršavaju ili poboljšanje ne nastupi u roku od 3-4 dana, javite se liječniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

**Sadržaj upute:**

1. Što je **neo-angin® bez šećera** i za što se koristi
2. Prije nego što počnete uzimati **neo-angin® bez šećera**
3. Kako uzimati **neo-angin® bez šećera**
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati **neo-angin® bez šećera**
6. Dodatne informacije

**1. ŠTA JE NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA I ZA ŠTO SE KORISTI**

**neo-angin® pastile bez šećera** je antiseptik za usta i grlo.

Indikacija:

Potporno liječenje upala sluznice grla praćenih tipičnim simptomima kao što su grlobolja, crvenilo ili otečenost.

**2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA**

**Nemojte uzimati neo-angin® bez šećera**

- ako ste alergični (preosjetljivi) na neku od djelatnih ili pomoćnih tvari **neo-angin® bez šećera**

**Budite oprezni s neo-angin®om bez šećera**

Dijabetičari

1 pastila **neo-angin® bez šećera** zaslađena izomaltom odgovara 0,22 krušne jedinice. Izomalt za razgradnju koristi inzulin!

Djeca

**neo-angin® bez šećera** nije pogodan za primjenu u djece mlađe od 6 godina.

**Uzimanje drugih lijekova s neo-angin®om bez šećera**

Molimo da obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijekove koji se ne izdaju na liječnički recept.

Interakcije s drugim lijekovima nisu poznate.

**Uzimanje hrane i pića s neo-angin®om bez šećera**

**neo-angin® bez šećera** se može uzimati neovisno o obrocima.

**Trudnoća i dojenje**

Ako ste trudni ili dojite, potražite savjet liječnika ili ljekarnika prije uzimanja bilo kojeg lijeka, pa tako i **neo-angin®a bez šećera**.

Nema dostupnih kliničkih podataka o izlaganju **neo-angin®u bez šećera** tijekom trudnoće. Ispitivanja na životinjama ne pokazuju da **neo-angin® bez šećera** izravno ili neizravno štetno djeluju na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porod ili postnatalni razvoj.

Zbog nedovoljne količine informacija, nije moguće u potpunosti isključiti rizike za fetus, pa se stoga ne preporučuje uzimanje ovog lijeka tijekom trudnoće ili dojenja.

**Upravljanje vozilima i strojevima**

Nema podataka.

**Važne informacije vezane uz učinak nekih pomoćnih tvari**

**neo-angin® bez šećera** sadrži boju Ponceau 4R (E124), koja može uzrokovati alergijske reakcije.

**neo-angin® bez šećera** sadrži izomalt. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.



32 010 550 04P0415 41 150206BIH



### 3. KAKO UZIMATI NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA

Uvijek uzimajte pastilu **neo-angin® bez šećera** točno prema ovdje navedenim uputama. Molimo da se obratite liječniku ili ljekarniku ako niste sigurni kako se uzima ovaj lijek. Pridržavajte se ovih uputa osim ako liječnik nije propisao drugačije.

Odrasli i djeca starija od 6 godina trebaju polako otopiti jednu pastilu u ustima svakih 2-3 sata. Maksimalna dnevna doza je 6 pastila.

Ako Vam se simptomi pogoršaju ili ne nastupi poboljšanje u roku od 3-4 dana, javite se liječniku.

Ako uzmete više **neo-angin®a bez šećera** nego što ste trebali Nema prijavljenih slučajeva predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti **neo-angin® bez šećera**  
Ako ste zaboravili uzeti **neo-angin® bez šećera** ili ste uzeli manje nego što je potrebno, nastavite uzimati pastile u skladu s uputama.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom **neo-angin®a bez šećera** obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

### 4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Nisu poznate.  
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

### 5. KAKO ČUVATI NEO-ANGIN® BEZ ŠEĆERA

**neo-angin® bez šećera** trebate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

**neo-angin® pastile bez šećera** čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakiranju (zaštićeno od vlage).

#### Rok valjanosti:

Rok valjanosti naveden je na vanjskom pakiranju.  
Rok valjanosti je 5 godina od datuma proizvodnje navedenog na pakovanju!  
**neo-angin® pastile bez šećera** se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.  
Datum isteka roka valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju bacati u slivnik ili komunalni otpad. Upitajte ljekarnika kako na siguran način odložiti lijekove koji Vam više nisu potrebni. Takve mjere pomažu u očuvanju okoliša.

### 6. DODATNE INFORMACIJE

#### Što sadrži **neo-angin® bez šećera**:

1 pastila sadrži djelatne tvari:  
1,20 mg 2,4 diklorbenzalnog alkohola;  
0,60 mg amilmetakrezola;  
5,72 mg levomentola.

#### Pomoćne tvari:

izomalt, boja Ponceau 4 R (E124), tartaralna kiselina, eterično ulje zvjezdastog aniša, eterično ulje paprene metvice.

#### Kako izgledaju pastile **neo-angin® bez šećera** i sadržaj pakiranja:

Pastile  
Crvene, okrugle, blago bikonveksne, gotovo prozirne pastile  
24 (2x12) pastile u PVC/ PVDC//Al blisteru

#### Režim izdavanja

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

#### PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)

DIVAPHARMA GmbH  
Motzener Strasse 41  
12277 Berlin, Njemačka

#### PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja lijeka u promet)

DIVAPHARMA GmbH  
Motzener Strasse 41  
12277 Berlin, Njemačka

#### NOSITELJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO  
Igmanska 5a  
71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

**Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet**  
**neo-angin® bez šećera**, pastila, 24 x (1,2 mg + 0,6 mg + 5,72 mg): 04-07.10-6027/13 od 23.06.2014.

32 010 550 04P0415 41 150206BIH