

UPUTA ZA PACIJENTA**neo-angin®**

1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg

PASTILA

2,4 diklorbenzilni alkohol, amilmetakrezollevomentol

Pažljivo pročitajte ovu uputu, jer sadrži važne informacije.

Iako se lijek ne izdaje na liječnički recept, **neo-angin®** morate pažljivo koristiti kako bi liječenje bilo što djelotvornije.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je morati ponovno pročitati.

Za dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.

Ako se simptomi pogoršavaju ili poboljšanje ne nastupi u roku od 3-4 dana, javite se liječniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj upute:

1. Što je **neo-angin®** i za što se koristi
2. Prije nego što počnete uzimati **neo-angin®**
3. Kako uzimati **neo-angin®**
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati **neo-angin®**
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE NEO-ANGIN I ZA ŠTA SE KORISTI
neo-angin je antiseptik za usta i grlo.**Indikacije:**

Potporno liječenje upale sluznice grla praćene tipičnim simptomima kao što su grlobolja, crvenilo ili otečenost.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI NEO-ANGIN®**Nemojte uzimati **neo-angin®****

- ako ste alergični (preosjetljivi) na neku od djelatnih ili pomoćnih tvari lijeka neo-angin

Budite oprezni s lijekom **neo-angin®****Dijabetičari**

1 pastila **neo-angin®** odgovara 0,22 krušne jedinice

Dieca

neo-angin® nije pogodan za primjenu u djece mlađe od 6 godina.

Uzmanjanje drugih lijekova s **neo-angin®om**

Molimo da obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijekove koji se ne izdaju na liječnički recept.
Interakcije s drugim lijekovima nisu poznate.

Uzmanjanje hrane i pića s **neo-angin®om**

neo-angin se može uzimati neovisno o obrocima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, potražite savjet liječnika ili ljekarnika prije uzimanja bilo kojeg lijeka, pa tako i **neo-angin®**a.

Nema dostupnih kliničkih podataka o izlaganju **neo-angin®** u tijekom trudnoće. Ispitivanja na životinjama ne pokazuju da **neo-angin®** izravno ili neizravno štetno djeluju na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porod ili postnatalni razvoj.

Zbog nedovoljne količine informacija, nije moguće u potpunosti isključiti rizike za fetus, pa se stoga ne preporučuje uzimanje ovog lijeka tijekom trudnoće ili dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka.

Ostala upozorenja

Neo-angin sadrži boju Ponceau 4R (E124), koja može uzrokovati alergijske reakcije.

3. KAKO UZIMATI NEO-ANGIN®

Uvijek uzimajte **neo-angin®** točno prema ovdje navedenim uputama. Molimo da se obratite liječniku ili ljekarniku ako niste sigurni kako se uzima ovaj lijek. Pridržavajte se ovih uputa osim ako liječnik nije propisao drugačije.



Upute

Odrasli i djeca starija od 6 godina trebaju polako otopiti jednu pastilu u ustima svaka 2-3 sata.
Maksimalna dnevna doza je 6 pastila.
Ako se simptomi pogoršaju ili ne nastupi poboljšanje u roku od 3-4 dana, javite se liječniku.

Ako uzmete više *neo-angin nego što ste trebali**
Nema prijavljenih slučajeva predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti *neo-angin**

Ako ste zaboravili uzeti *neo-angin** ili ste uzeli manje nego što je potrebno, nastavite uzimati pastile u skladu s uputama.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom *neo-angin** obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Nisu poznate,
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. KAKO ČUVATI NEO-ANGIN*

*neo-angin** trebate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju (zaštićeno od vlage).

Rok valjanosti:

Rok valjanosti naveden je na vanjskom pakovanju.
Rok valjanosti je 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na pakovanju!
*neo-angin** se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.
Datum isteka roka valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju bacati u slivnik ili komunalni otpad. Upitajte ljekarnika kako na siguran način odložiti lijekove koji Vam više nisu potrebni. Takve mjere pomažu u očuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što sadrži *neo-angin*®:

Dijelatne tvari:

1 pastila sadrži:
1,20 mg 2,4 diklorbenzilnog alkohola
0,60 mg amilmetakrezola
5,90 mg levomentola

Pomoćne tvari:

saharoza, glukoza, tekuća, boja Ponceau 4R (E124), tartaratna kiselina, eterično ulje
svjezdastog anisa, eterično ulje paprene metvice.

Kako izgledaju pastile *neo-angin i sadržaj pakovanja:**

Pastile:

Crvene, okrugle, blago bikonveksne, gotovo prozirne pastile.
24 (2x12) pastile u PVC/PE/PVDC//Al blisteru.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)

DIVAPHARMA GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlin, Njemačka

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja lijeka u promet)

DIVAPHARMA GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlin, Njemačka

NOSITELJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

FARMAVITA d.o.o., SARAJEVO
Igmanška 5a
71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
neo-angin®, pastila, 24 x (1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg): 04-07.10-6026/13 od 23.06.2014.

***neo-angin*®**
PASTILA