

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НЕО-АНГИН® череша

1,20 mg/0,60/5,90 mg таблетки за смучене

neo-angin® cherry

1,20/0,60/5,90 mg lozenges

2,4 - дихлоробензил алкохол/амилметакрезол/левоментол
2,4 – dichlorobenzyl alcohol/amylnmetacresol/levomenthol

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява нео-ангин® череша и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете нео-ангин® череша
3. Как да приемате нео-ангин® череша
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате нео-ангин® череша
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕО-АНГИН® ЧЕРЕША И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

нео-ангин® череша е антисептичен терапевтичен продукт, притежаващ леко обезболяващо действие за устата и гърлото.

Той е предназначен за локално, ранно лечение на леки възпаления на лигавиците на устната кухина и гърлото, което също така може да помогне да се намали необходимостта от използване на антибиотици. Тези инфекции предизвикват възпаление на устната кухина и гърлото със симптоми, като болки в гърлото и дрезгавост на гласа, възпаление на устната лигавица и венците.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ НЕО-АНГИН® ЧЕРЕША

Не приемайте нео-ангин® череша

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към някоя от активните вещества или към някоя от останалите съставки на нео-ангин® череша (изброени в т. 6).
- При деца под 6 годишна възраст



Предупреждения и предпазни мерки

Консултирайте се с Вашия лекар в случай, че посоченото се отнася за Вас:

- Ако симптомите на инфекция на устната кухина и фаринкса продължават повече от 3-4 дни или дори се влошават, моля да се консултирате с Вашия лекар.
- Ако страдате от хронична кашлица или дрезгавост на гласа, моля да се консултирате с Вашия лекар преди да започнете да приемате нео-ангин® череша. Тези прояви може да бъдат също симптоми на евентуални злокачествени заболявания.

Други лекарства и нео-ангин® череша.

Не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти.

Не се препоръчва едновременното приложение с други продукти, които действат на устната кухина и лигавиците.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително такива, отпускани без рецепта.

нео-ангин® череша с храни и напитки

Няма данни, показващи че храната или напитките оказват влияние върху действието на нео-ангин® череша. Не приемайте храна или напитки непосредствено след приема на нео-ангин® череша, за да се избегне извличането на активното вещество от лигавицата на устата и фаринкса.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, се посъветвайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Няма клинични данни за вредни ефекти на нео-ангин® череша по време на бременност. Данните от проведените проучвания при опитни животни не показват директни или индиректни увреждащи ефекти по отношение на бременността, развитието на ембриона/плода, раждането и послеродовото развитие.

Поради отсъствието на достатъчно информация не е възможно напълно да се изключат рисковете за плода и по тази причина не се препоръчва използване на лекарствения продукт по време на бременност.

Шофиране и работа с машини

Ефектът на този лекарствен продукт върху способността за шофиране и работа с машини е неизвестен. Въпреки това е малко вероятно те да бъдат нарушени.

Важна информация относно някои от съставките на нео-ангин® череша

- Този лекарствен продукт съдържа оцветителя кохинил червено А, който може да причини алергични реакции.
- нео-ангин® череша съдържа изомалтоза. В случай, че Вашият лекар Ви е уведомил, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него преди да започнете да приемате този лекарствен продукт



- нео-ангин® череша съдържа 2,58 g изомалтоза (захарен заместител) в една таблетка за смучене (еквивалентни приблизително на 0,22 въглехидратни единици).

Това трябва да се има предвид при болни със захарен диабет.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ НЕО-АНГИН® ЧЕРЕША

Винаги приемайте нео-ангин® череша точно според указанията в листовката. Ако не сте напълно сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Указания

нео-ангин® череша е предназначен за употреба в устата и фаринкса (перорално приложение).

Възрастните и децата над 6 годишна възраст трябва да приемат по една таблетка за смучене, която бавно да се разтвори в устата на всеки 2-3 часа. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене. В случай, че симптомите на инфекция на устната кухина и фаринкса продължават повече от 3-4 дни или дори се влошават, моля да се консултирате с Вашия лекар. Този продукт не е предназначен за деца под 6 годишна възраст.

Ако сте приели повече от необходимата доза нео-ангин® череша

В случай, че сте приели по-голямо количество нео-ангин® череша, трябва при проява на някакви нежелани реакции да се обърнете към Вашия лекар или фармацевт.

Не са отбелязани случаи на предозирание. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене. В случаи на предозирание може да се очакват дразнене на лигавиците на устата и стомаха.

Ако сте пропуснали да приемете нео-ангин® череша

Не вземайте двойна доза нео-ангин® череша, за да компенсирате пропуснатия прием.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, нео-ангин® череша може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Оценката на нежеланите реакции се базира на следната честота

Много чести	Повече от 1 от 10 пациенти
Чести	По-малко от 1 от 10 пациенти, но повече от 1 от 100 пациенти
Нечести	По-малко от 1 от 100 пациенти, но повече от 1 от 1000 пациенти
Редки	По-малко от 1 от 1000 пациенти, но повече от 1 от 10000 пациенти
Много редки	По-малко от 1 от 10000 пациенти, включително индивидуалните случаи
С неизвестна честота	Не може да се определи от наличните данни



Много редки:

- стомашно разстройство
- дразнене на устната лигавица
- алергични реакции спрямо някоя от съставките

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля да уведомите Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ НЕО-АНГИН® ЧЕРЕША

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте нео-ангин® череша след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте при температура под 25° C.

Съхранявайте в оригиналната опаковка.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт, как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа нео-ангин® череша

- Активните вещества са:** 2,4-дихлоробензил алкохол 1,20 mg, амилметакрезол 0,60 mg левоментол 5,90 mg
- Другите съставки са:** ментово масло, изомалтоза, винена киселина, аромат на череша, кохинил червено А (E124), индиготин (E132).

Как изглежда нео-ангин® череша и какво съдържа опаковката

нео-ангин® череша се предлага под формата на таблетки за смучене. Таблетките за смучене са с червен цвят, кръгли и полупрозрачни. нео-ангин® череша се предлага в картонена опаковка с 12, 16, 24 и 48 таблетки за смучене.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Divapharma GmbH
12274 Berlin
Германия

Дата на последно одобрение на листовката

октомври/2012

