

# neo-angin®

pastile bez šećera

2,4-diklorbenzilni alkohol, amilmetakrezol, levomentol

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadržava Vama važne podatke.**

- Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 do 4 dana.

**Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što su neo-angin® pastile bez šećera i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati neo-angin® pastile bez šećera
3. Kako uzimati neo-angin® pastile bez šećera
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati neo-angin® pastile bez šećera
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

## 1. ŠTO SU NEO-ANGIN® PASTILE BEZ ŠEĆERA I ZA ŠTO SE KORISTE

neo-angin® pastile bez šećera su antiseptik i blagi analgetik za usta i ždrijelo čije se djelovanje temelji na kombinaciji 2,4-diklorbenzilnog alkohola, amilmetakrezola i levomentola. Lijek je namijenjen za kratkotrajno potporno liječenje upala sluznice ždrijela praćenih tipičnim simptomima kao što su grlobolja, crvenilo ili otečenost.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 do 4 dana primjene ovog lijeka.

## 2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI NEO-ANGIN® PASTILE BEZ ŠEĆERA

**Nemojte uzimati neo-angin® pastile bez šećera**

- ako ste alergični na djelatne tvari ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ukoliko imate astmu i druge bolesti dišnih puteva s osjetljivošću dišnih puteva kod kojih može doći do bronhokonstrukcije zbog ulja paprene metvice i mentola.
- Pastile se ne smiju primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

## Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete neo-angin® pastile bez šećera u slučaju prethodnog dugotrajnog kašljanja, iskašljavanja ili promuklosti. Kod ustrajnih simptoma, porasta temperature ili pogoršanja općeg stanja, potrebno se odmah posavjetovati s liječnikom jer će stanje možda biti potrebno liječiti s drugim lijekovima.

Ako imate žgaravicu ili hijatalnu herniju ponekad može doći do pogoršanja ovih simptoma nakon uzimanja ulja paprene metvice, te je u tom slučaju potrebno prekinuti primjenu ovog lijeka.

## Drugi lijekovi i neo-angin® pastile bez šećera

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Interakcije s drugim lijekovima nisu poznate.

## neo-angin® pastile bez šećera s hranom i pićem

neo-angin® pastile bez šećera nemojte uzimati neposredno prije i tijekom obroka ili uzimanja tekućine.

## Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nema dostupnih kliničkih podataka o izlaganju neo-angin® pastilama bez šećera tijekom trudnoće. Ispitivanja na životinjama ne pokazuju da neo-angin® pastile bez šećera izravno ili neizravno štetno djeluju na trudnoću, razvoj ploda, porod ili razvoj djeteta.

Zbog nedovoljne količine informacija, nije moguće u potpunosti isključiti rizike za nerođeno dijete, pa se stoga ne preporučuje uzimanje ovog lijeka tijekom trudnoće ili dojenja.

## Upravljanje vozilima i strojevima

Utjecaj ovog lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima nije vjerojatan.

## neo-angin® pastile bez šećera sadrže pomoćne tvari

Lijek sadržava boju Ponceau 4R (E124) koja može uzrokovati alergijske reakcije.

Jedna neo-angin® pastila bez šećera sadržava 2,58 g izomalta koji je zamjena za šećer što odgovara otprilike 6 kcal (26 kJ). Izomalt može imati blagi laksativni učinak. Ako Vam je liječnik rekao da imate poremećaj nepodnošenja nekih šećera, prije uzimanja ovog lijeka posavjetujte se sa svojim liječnikom.

## 3. KAKO UZIMATI NEO-ANGIN® PASTILE BEZ ŠEĆERA

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

## Preporučena doza je:

Osadrasli i djeca starija od 6 godina trebaju polako otopiti jednu





pastilu u ustima svakih 2 do 3 sata. Maksimalna dnevna doza je sveukupno 6 pastila.

Ako Vam se simptomi pogoršaju ili ne nastupi poboljšanje u roku od 3 do 4 dana, javite se liječniku.

#### Primjena u djece

Lijek se ne smije primjenjivati u djece ispod 6. godine života.

#### Ako uzmete više neo-angin® pastila bez šećera nego što ste trebali

Nema prijavljenih slučajeva predoziranja. U slučaju predoziranja, koje je vrlo malo vjerojatno, nuspojave opisane u dijelu 4. mogu se javiti u intenzivnijem obliku te se preporučuje javiti svom liječniku koji će provesti simptomatsko liječenje.

#### Ako ste zaboravili uzeti neo-angin® pastile bez šećera

Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka kako bi nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

#### 4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

##### Moguće nuspojave i njihova učestalost:

Vrlo rijetko (javljaju se u manje od 1 na 10 000 korisnika lijeka): nadraženost sluznice usta i želuca.

Nepoznata učestalost (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka): Mogu se javiti alergijske reakcije poput oticanja usta i jezika.

##### Dodatne nuspojave u djece

Ulje paprene metvice može uzrokovati grč grkljana u dojenčadi i djece do 2 godine starosti.

##### Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)  
Odsjek za farmakovigilanciju  
Ksaverska cesta 4  
10 000 Zagreb  
Republika Hrvatska  
Fax: + 385 (0)1 4884 110  
Website: [www.halmed.hr](http://www.halmed.hr)  
e-mail: [nuspojave@halmed.hr](mailto:nuspojave@halmed.hr)

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

#### 5. KAKO ČUVATI NEO-ANGIN® PASTILE BEZ ŠEĆERA

neo-angin® pastile bez šećera čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 30°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

#### 6. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

##### Što sadrže neo-angin® pastile bez šećera

##### Djelatne tvari:

1 pastila sadržava 1,20 mg 2,4 diklorbenzilnog alkohola; 0,60 mg amilmetakrezola; 5,72 mg levomentola.

Pomoćne tvari: izomalt (E953); boja Ponceau 4 R (E124); tartaralna kiselina; eterično ulje zvjezdastog aniša; eterično ulje paprene metvice.

Kako izgledaju neo-angin® pastile bez šećera i sadržaj pakiranja neo-angin® pastile bez šećera su crvene, okrugle, blago bikonveksne, gotovo prozirne pastile.

24 (2x12) pastile u PVC/ PVDC//Al blisteru

48 (4x12) pastila u PVC/ PVDC//Al blisteru

##### Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač DIVAPHARMA GmbH

Motzener Strasse 41, 12277 Berlin  
Njemačka

##### Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Clinres farmacija d.o.o.  
Srebrnjak 61, 10000 Zagreb  
Hrvatska  
Telefon: 01/2396 900

##### Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranom prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u kolovozu 2015.