

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Нео-ангин®

Регистрационный номер:

П N013046/02

Торговое название: *нео-ангин*®

Группировочное название:

Амилметакрезол + Дихлорбензиловый спирт + [Левоментол]

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания без сахара, таблетки для рассасывания без сахара [вишневые]

Состав:

1 таблетка для рассасывания без сахара содержит:

Действующие вещества:

амилметакрезол 0,60 мг,
дихлорбензиловый спирт 1,20 мг,
левоментол 5,72 мг.

Вспомогательные вещества: аниса звездчатого плодов масло 2,50 мг, мяты перечной листьев масло 0,52 мг, изомальт 2579,65 мг, винная кислота 9,37 мг, краситель пунцовый (Понсо 4 R) 0,44 мг.

1 таблетка для рассасывания без сахара вишневая содержит:

Действующие вещества:

амилметакрезол 0,60 мг,
дихлорбензиловый спирт 1,20 мг,
левоментол 5,72 мг.

Вспомогательные вещества: изомальт 2566,03 мг, винная кислота 19,51 мг, ароматизатор вишневый (P0603463) 5,20 мг, сукралоза 1,30 мг, краситель пунцовый (Понсо 4 R) 0,44 мг.

Описание:

Таблетки для рассасывания без сахара:

круглые, слегка двояковыпуклые, таблетки с шероховатой поверхностью красного цвета с характерным запахом. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев. Возможно появление белого налета.

Таблетки для рассасывания без сахара вишневые: круглые, слегка двояковыпуклые, таблетки с шероховатой поверхностью красного цвета с характерным запахом. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев. Возможно появление белого налета.

Фармакологическая группа:

Антисептическое средство

Код АТХ:

R02AA20

Фармакологические свойства:

Комбинированный антисептический препарат для местного применения в полости рта и глотки. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и грибов.

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата *нео-ангин*® отсутствуют. Из-за отсутствия сахара *нео-ангин*® не увеличивает риск развития кариеса.

Показания к применению:

Профилактика и лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (фарингиты, ларингиты, неосложнённые формы ангины, стоматиты, гингивиты).

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Дети до 6 лет.



**Способ применения и дозы:**

Взрослым и детям старше 6 лет назначают по 1 таблетке каждые 2-3 часа. Таблетки рассасывают до полного растворения. Максимальная суточная доза – 8 таблеток.

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции, диспепсия.

Передозировка:

Не описано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата **нео-ангин®** с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания.

По 8 или 12 таблеток в контурную ячейковую упаковку из ПВХ-ПВДХ/Al фольги (блистер).

По 2 блистера по 8 таблеток или по 2 или 4 блистера по 12 таблеток вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

Условия хранения:

В сухом месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

Срок годности 5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Производитель

Произведено: Клостерфрау Берлин ГмБХ, Германия для ДИВАФАРМА ГмБХ, Мотценер штр. 41, 12277 Берлин, Германия.
Тел.: (030) 72007-266

«Организация, уполномоченная принимать претензии и предоставлять дополнительную информацию о препарате на территории РФ»:

ООО «ЭмСиЭл-фарма»
117246 Москва, Научный проезд,
д. 8, стр. 1.
Тел.: (495) 332-34-30

нео-ангин®