

Należy zapoznać się z właściwościami leku przed zastosowaniem

Ulotka dla pacjenta
neo-angin N

PŁYN DO INHALACJI Z ATOMIZERA

Alcoholum dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Mentholum
Płyn do inhalacji z atomizera (14,58 mg + 2,92 mg + 0,87 mg)/ml

Skład:

1 ml płynu zawiera substancje czynne:

alkohol 2,4-dichlorobenzylowy	14,58 mg
p-pentylo-m-krezol	2,92 mg
mentol	0,87 mg

oraz substancje pomocnicze:

olejek z anyżu gwiaździstego	1,22 mg
olejek miętowy	0,28 mg
etanol 96 %	0,2 g
glikol propylenowy	0,764 g

Opis działania:

Preparat ***neo-angin N*** zawiera substancje czynne:

alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i p-pentylo-m-krezol o działaniu bakteriobójczym na większość Gram-dodatnich i Gram-ujemnych bakterii wywołujących infekcje w jamie ustnej i gardła, a także przeciwgrzybiczym na grzyby powodujące pleśniawki.

neo-angin N ma przyjemny smak i jest dobrze tolerowany.

Wskazania:

Zakażenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:

W przypadku utrzymującego się przez kilka dni bólu gardła, lub występowania takich objawów jak kaszel i gorączka, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Glikol propylenowy może powodować wystąpienie alergii. Preparat zawiera etanol-0,036 ml 96 % etanolu w pojedynczej dawce. Etanol może powodować szkodliwe działanie u pacjentów z uszkodzoną wątrobą, padaczką, uszkodzeniami mózgu, chorobami umysłowymi oraz u alkoholików.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

Wpływ substancji czynnych na kobiety ciężarne i karmiące nie jest znany. Ze względu na zawartość etanolu preparatu nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu:

Preparat zawiera minimalną ilość alkoholu etylowego. Stosowany zgodnie z zaleceniami producenta, nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

Dawkowanie:

Rozpylić preparat na miejsca zmienione chorobowo kilkakrotnie w ciągu dnia (do 6 razy na dobę), każdorazowo dwukrotnie naciskając głowicę. Każde naciśnięcie głowicy uwalnia dokładnie odmierzoną dawkę leku. Dwukrotne rozpylenie leku odpowiada 1 dawce.

Sposób użycia:

Po zdjęciu kapturka ochronnego należy rozpylić dawkę roztworu w obrębie jamy ustnej poprzez dwukrotne naciśnięcie głowicy.

Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności.

Przedawkowanie:

Dotychczas objawów przedawkowania nie stwierdzono. W razie przedawkowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane:

Może wystąpić nadwrażliwość na składniki preparatu.

Dostępne opakowania:

Butelka o zawartości 15 lub 30 ml.

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w temperaturze do 25 °C.

Podmiot odpowiedzialny:

DIVAPHARMA GmbH,
D-12274 Berlin, Niemcy

Pozwolenie nr R/2481

Data ostatniej weryfikacji ulotki: czerwiec 2001.