

PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR

# **neo-angin**<sup>®</sup>

fără zahăr, pastile

Alcool 2,4 diclorobenzilic/amilmetacrezol/levomentol

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 4-5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

## **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este **neo-angin**<sup>®</sup> fără zahăr și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați **neo-angin**<sup>®</sup> fără zahăr
3. Cum să utilizați **neo-angin**<sup>®</sup> fără zahăr
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează **neo-angin**<sup>®</sup> fără zahăr
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este **neo-angin**<sup>®</sup> fără zahăr și pentru ce se utilizează**  
**neo-angin**<sup>®</sup> fără zahăr este indicat ca tratament adjuvant în infecții ale cavității bucale și gâtului.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați **neo-angin**<sup>®</sup> fără zahăr**

**Nu utilizați **neo-angin**<sup>®</sup> fără zahăr:**

- dacă sunteți alergic la alcool 2,4 diclorobenzilic, amilmetacrezol, levomentol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la punctul 6).
- la copii cu vârsta sub 6 ani.

## **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați **neo-angin**<sup>®</sup> fără zahăr, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă simptomatologia persistă mai mult de 4-5 zile, se recomandă reevaluarea diagnosticului și a tratamentului.

## **neo-angin**<sup>®</sup> împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Nu se cunosc interacțiuni cu alte medicamente.

## **neo-angin**<sup>®</sup> fără zahăr împreună cu alimente și băuturi

**neo-angin**<sup>®</sup> fără zahăr se administrează independent de orele de masă.

## **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Datorită informațiilor insuficiente, nu pot fi eliminate total riscurile asupra fătului, de aceea, prescrierea medicamentului trebuie făcută cu precauție la gravide și în timpul alăptării.

## **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

**neo-angin**<sup>®</sup> fără zahăr nu afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

**neo-angin**<sup>®</sup> fără zahăr conține izomalt 2,58 g (înlocuitor de zahăr) (echivalent cu aproximativ 0,22 unități carbohidrat). Acest fapt trebuie luat în considerare în cazul pacienților cu diabet zaharat.

Izomaltul poate avea un ușor efect laxativ; valoarea calorică este de 25 kJ (5,9 kcal).

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat ca aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

**neo-angin**<sup>®</sup> fără zahăr conține roșu coșenilă A (E 124) care poate provoca reacții alergice.



32 011 153 06P0816 65 149712RO



### 3. Cum sa utilizați *neo-angin*<sup>®</sup> fără zahăr

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Adulți și copii cu vârsta peste 6 ani: doza recomandată este de o pastilă *neo-angin*<sup>®</sup> fără zahăr la 2-3 ore, dacă medicul nu recomandă altfel. Doza maximă este de 6 pastile pe zi.

Pastila trebuie lăsată să se dizolve încet în cavitatea bucală. Fără recomandarea medicului, *neo-angin*<sup>®</sup> fără zahăr nu trebuie administrat mai mult de 4-5 zile.

#### Dacă utilizați mai mult *neo-angin*<sup>®</sup> fără zahăr decât trebuie

Nu s-au semnalat cazuri de supradozaj la om.

#### Dacă uitați să utilizați *neo-angin*<sup>®</sup> fără zahăr

Dacă ați uitat să luați *neo-angin*<sup>®</sup> fără zahăr sau ați luat mai puțin, continuați direct cu următoarea doză. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### 4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

După utilizarea *neo-angin*<sup>®</sup> fără zahăr au fost observate următoarele reacții adverse:

*Foarte rare* (afectează mai puțin de 1 din 10000 persoane): iritații ale mucoasei bucale și gastrice. Teoretic, pot să apară, de asemenea, reacții alergice.

#### Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe website-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### 5. Cum se păstrează *neo-angin*<sup>®</sup> fără zahăr

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și blister, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 30 °C, în ambalajul original.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

### 6. Conținutul ambalajului și alte informații

#### Ce conține *neo-angin*<sup>®</sup> fără zahăr

- Substanțele active sunt alcool 2,4 diclorobenzilic, amilmetacrezol și levomentol. Fiecare pastilă conține alcool 2,4 diclorobenzilic 1,2 mg, amilmetacrezol 0,6 mg și levomentol 5,72 mg.
- Celelalte componente sunt: ulei de anason, ulei de mentă, izomalt, roșu coșenilă A (E 124), acid tartric.

#### Cum arată *neo-angin*<sup>®</sup> fără zahăr și conținutul ambalajului

Pastile rotunde, de culoare roșie, ușor biconvexe și ușor transparente.

#### Mărimea ambalajului

Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 12 pastile

#### Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

DIVAPHARMA GmbH  
Motzener Strasse 41  
D-12277, Berlin, Germania

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:

Romastru Trading S.R.L.  
Str. Biharia nr. 67-77, METAV Business PARK  
Cod 013981, București, România

Acest prospect a fost revizuit în lunie 2016.

32 011 153 06P0816 65 149712RO